

Ф
Форлак®

Умное слабительное для детей и взрослых! Учит кишечник работать самостоятельно!⁴

Режим приема для взрослых:



Форлак® 10 г Рег. уд. П N014670/01 от 17.11.08

Курс приема 2–4 недели и длительнее^{2,4}

1 пакетик Форлакса 10 г растворить в стакане воды
принимать утром (если дозировка 1 пакетик в день);
утром и вечером (если дозировка 2 пакетика в день)¹

**Курсовое применение Форлакса научит кишечник
работать правильно, а эффект «обучения»
сохранится после окончания курса лечения⁴**

Информация по препарату предоставляется в соответствии с п.4 ст.74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для ознакомления о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов.

Если Вы хотите сообщить о нежелательных явлениях, жалобе на препарат направляйте, пожалуйста, свои претензии лечащему врачу, в регуляторные органы или в Московское представительство компании «Ипсен Фарма»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, 19, тел: +7 (8) 495 258-54-00, факс: +7 (8) 495 258-54-01, pharmacovigilance.russia@ipсен.com В нерабочие часы круглосуточные телефоны: 8 (916) 999-30-28 (для приема сообщений о нежелательных явлениях и претензиях на качество препарата компании Ипсен); 8 (800) 700-40-25 (служба медицинской информации по препаратам компании для специалистов здравоохранения).

IPSEN
Innovation for patient care

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Ф

Форлак®

Умное слабительное для детей и взрослых! Учит кишечник работать самостоятельно!³

Режим приема для детей:

от 6 месяцев
до года

4 г



от года до 4 лет



4 г



от 4 до 8 лет



4 г



от 8 до 18 лет



10 г



Форлак® 10 г Рег. уд. П N014670/01 от 17.11.08

Форлак® 4 г Рег. уд. ЛС-002549 от 23.08.10

Необходим курсовой прием от 2–4 недель³ до 3 месяцев²

1 пакетик Форлакса 4 г растворить в 50 мл воды;
1 пакетик Форлакса 10 г растворить в стакане воды.

Принимать однократно утром (если дозировка 1 пакетик в день);
утром и вечером (если дозировка более 1 пакетика в день)²

**Курсовое применение Форлакса
научит кишечник работать
правильно, а эффект «обучения»
сохранится после окончания
курса лечения³**

- 1) Lee-Robichaud H., Thomas K., Morgan J., Nelson R.L. Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation (Review) // The Cochrane Library. 2011. Issue 1. Ли-Робичауд и др. Лактулоза в сравнении с полиэтиленгликолем при хроническом запоре (Обзор) // Лаборатория Кохрейн. 2011.
- 2) PH. Denis, E. Lerebours. Study of the long-term tolerance of Forlax® in 16 patients treated for an average 17 months for chronic constipation // Medecine & Chirurgie Digestives. 1996. Volume 25. № 5. Денис П. Леребуос Э. Исследование длительного применения препарата Форлак у 16 пациентов с хроническим запором в течение 17 месяцев в среднем // Терапевтический Новости. 1996; 25 (5).
- 2) Инструкция по медицинскому применению препарата Форлак®. <http://grfs.rosminzdrav.ru/>
- 3) Бабаян М.Л. Коррекция функциональных запоров у детей // Журнал «Детская энтерология». 2011. том 8. № 4.
- 4) Черёмушкин С.В., Кучерявый Ю.А. Ретроспективная оценка эффекта последствия полиэтиленгликоля при лечении хронического запора // Журнал Врач. 2013. № 3.